

4. LANDE, BRUGHIERE E ARBUSTETI TEMPERATI

Lande alpine e subalpine

Cod_Natura 2000: 4060

Cod_CORINE: 31.4A

Descrizione generale

Brughiere formate da arbusti nani o prostrati della fascia alpina e subalpina delle montagne dell'Eurasia, dominate da Ericacee, da ginepri nani o da ginestre. (La categoria individua formazioni vegetazionali che sono tipiche di quote più alte, ben rappresentate nell'Appennino Tosco-emiliano, oltre il limite del bosco). Dal punto di vista fitosociologico tale cenosi è riferibile all'associazione *Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis* Pirola et Corbetta 1971 ex Ferrari et Piccoli 1997 var. a *Vaccinium myrtillus*,

Combinazione fisionomica di riferimento

Vaccinium myrtillus specie dominante con *Hypericum richeri*, *Anemonastrum narcissiflorum* (= *Anemones narcissiflora*), *Potentilla erecta*, *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*.

Presenza locale

Presente unicamente nel versante romagnolo, si colloca sulla fascia di crinale che corre da Monte Falco alle pendici occidentali di Monte Acuto, ad orlo o all'interno delle faggete di quota, e al margine delle praterie a dominanza di nardo.

Stato di conservazione

Data la superficie molto limitata, spesso al margine della faggeta e in fase di colonizzazione da parte di questa, nonché l'aspetto molto impoverito rispetto a quelle presenti nell'Appennino settentrionale, lo stato di conservazione è da considerarsi mediocre.

Fattori limitanti e di minaccia

La non gestione rappresenta la principale minaccia.

Linee di gestione consigliate

Contenere la naturale evoluzione degli arbusti verso il bosco recuperando attività di pascolo non continuo e comunque attentamente controllato, in modo che non comporti sovraccarichi.

Specie di fauna selvatica potenzialmente legate all'habitat

Podarcis muralis, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Lullula arborea*, *Euphydryas provincialis*.